Материал размещен на www.healthquality.ru

Санитарно-эпидемиологические аспекты организации вскармливания в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

ВСЯ РАБОТА В ЛЮБОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧИНАЕТСЯ

С МЫТЬЯ РУК!!!

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ВХОДОМ В
ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ
АНТИСЕПТИКОМ.
ОБСУШИВАТЬ РУКИ НЕ НАДО.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

- В целях профилактики ВБИ обезараживанию подлежат руки медицинских работников (гигиеническая обработка рук, …) и кожные покровы пациентов.

- Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:

- гигиеническое мытье рук с мылом и водой
- обработка рук кожным антисептиком

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

Гигиеническую обработку рук следует проводить:

- Перед и после контакта с пациентом
- Перед и после выполнения различных манипуляций
- После контакта с секретами и экскретами, слизистыми оболочками и повязками.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

Использование перчаток:

- Во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, слизистыми оболочками и поврежденной кожей.

- Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте с двумя и более пациентами.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

А после мытья рук …

Организация вскармливания в отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей .

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

Организация грудного вскармливания.

Если ребенка нельзя приложить груди:

- **3.5.1. В перинатальных центрах при ОПНН выделяют помещения для сцеживания грудного молока**
- **3.5.2. Для кормления новорожденного используется сцеженное молоко только его матери**
- **3.5.3. При необходимости сцеживания грудного молока матерям выдают обеззараженную посуду**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

***Организация грудного вскармливания*:**

- **3.5.4. В случае необходимости отсроченного кормления новорожденного сцеженным молоком, собранное грудное молоко подвергается пастеризации…**

- **Бутылочки с молоком после пастеризации хранятся в специальном холодильнике не более 12 часов.**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

***Организация вскармливания*:**

- **3.5.5. Запрещается кормление нескольких детей из одной бутылочки.**
- **Вода и растворы для питья должны быть стерильными в индивидуальной разовой расфасовке.**
- **3.5.6. Допускается использование готовых жидких смесей.**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3.2630-10

Организация вскармливания:

- **3.5.6. Сухие и молочные смеси после вскрытия упаковки должны иметь маркировку с указанием даты и времени вскрытия.**
- **Разведение смесей осуществляется с использованием стерильной посуды.**
- **3.5.1. Приготовление смеси должно производиться в молочной комнате.**